

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА
Листовка - Приложение 2
Към Рег. № 20030522
Разрешение № 29268 / 04-05-2015
Одобрение №

Листовка: информация за потребителя

Ролетра 10 mg таблетки
Roletra 10 mg tablets

Лоратадин
(Loratadine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Ролетра и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ролетра
3. Как да приемате Ролетра
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ролетра
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ролетра и за какво се използва

Ролетра съдържа лоратадин. Лоратадин принадлежи към група лекарства, наречени антихистамини. Тяхното действие се осъществява чрез блокирането на една субстанция в организма, наречена хистамин. Това помага да се намалят алергичните симптоми.

Ролетра се използва:

- За облекчаване на симптомите, свързани с алергичния ринит (сенна хрема, алергия към прах и т.н.), както и кихане, хрема или сърбежи на носа, зачервени сълзящи очи с парене или сърбеж. Вие може да страдате от тези симптоми само през определен сезон или през цялата година.
- За да облекчите подуването, зачервяването, сърбежа по част от кожата, причинен от продължителна поява на кожни обриви или копривна треска (хронична идиопатична уртикария).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ролетра

Не приемайте Ролетра

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към лоратадин или някоя от останалите съставки на това лекарство (изборени в точка 6). Алергичната реакция може да включва обрив, сърбеж, подуване на лицето, устните или ръцете/краката или затруднения в дишането.

Обърнете специално внимание при употребата на Ролетра, ако:



- страдате от тежко чернодробно заболяване.

Моля, информирайте Вашия лекар дори и в случаите, когато сте имали подобни проблеми в миналото.

Лабораторни тестове

Това лекарство може да повлияе на резултатите от тестовете за кожна алергия. Бъдете сигурни, че лекарят и сестрата знаят, че приемате това лекарство. Налага се да прекратите приема за поне 48 часа, преди да се подложите на тези изследвания.

Други лекарства и Ролетра

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпуснати без рецепта.

При едновременен прием някои лекарства (кетоназол, еритромицин, шиметидин) могат да увеличат нивото на лоратадин в кръвта и да предизвикат нежелани реакции.

Ролетра с храна, напитки и алкохол

Ролетра може да се приема с или без храна.

Таблетките трябва да се поглъщат цели с чаша вода.

Избягвайте алкохолни напитки, докато не сте обсъдили употребата им с Вашия лекар.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ролетра таблетки не се препоръчват по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Ролетра може да причини сънливост или нарушение на зрението при някои пациенти. Това може да повлияе на способността за шофиране или работа с машини. Бъдете сигурни в това как реагирате на лекарството преди да шофирате, работите с машини или извършвате друга дейност, която би могла да бъде опасна, ако не сте концентрирани.

Ролетра съдържа лактоза

Вашето лекарство съдържа малки количества от неактивната съставка, наречена лактоза. Ако ви е казано, че имате лактозна непоносимост (галактозна непоносимост, Lapp-лактазна недостатъчност или глюкозо-галактозна малабсорбция) или имате непоносимост към някои захари, информирайте Вашия лекар, преди да приемете лекарството.

3. Как да приемате Ролетра

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Таблетките Ролетра трябва да се поглъщат цели с вода.

Препоръчителната доза е:

Възрастни и деца над 12 години:

10 mg веднъж дневно (1 таблетка дневно);

Деца от 2 до 12 години и тейсаци над 30 kg:

10 mg веднъж дневно (1 таблетка дневно).



